

CZY WIESZ, ŻE:

- Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.
- Przeżywalność wirusa wynosi:
 - 5 miesięcy w chłodzonym mięsie,
 - 300 dni w szynce parmeńskiej,
 - 6 miesięcy w szpiku kostnym,
 - 18 tyg. we krwi i zwłokach świń (w temperaturze pokojowej),
 - 280 dni w zakopanej w ziemi (w śledzionie).
- Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
- Okres inkubacji choroby to 4 - 8 dni (maksymalnie 21 dni).
- Pierwszym objawem choroby jest gorączka 41° - 42°C.
- Do zakażenia zwierząt dochodzi:
 - poprzez przewód pokarmowy,
 - poprzez drogi oddechowe,
 - poprzez uszkodzoną skórę,
 - poprzez odbyt,
 - poprzez krycie.
- Rezerwuarem wirusa mogą być:
 - dziki europejskie,
 - dzikie świnie afrykańskie,
 - guźce,
 - kleszcze.
- ASF jest chorobą nieuleczalną. Nie ma na nią szczepionki.
- Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy zwalczaniu ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

WARUNKIEM JEGO WYPŁATY JEST JEDNAK PRZESTRZEGANIE ZASAD BIOASEKURACJI !!!




WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA APELUJE

POSIADASZ ŚWINIĘ? 1, 10 CZY 100?

PAMIĘTAJ O PRZESTRZEGANIU BIOASEKURACJI !!!

**Rolniku – nie czekaj aż ASF pojawi się w Twojej
okolicy! Drobne zaniechanie może kosztować
Ciebie i innych producentów trzody utratę
jedyne źródła dochodów !!!**



**RODZIMA PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ
JEST TAKŻE W TWOICH RĘKACH !!!**

ZAPOZNAJ SIĘ Z OBOWIĄZKAMI I ZAKAZAMI, KTÓRYCH MUSISZ PRZESTRZEGAĆ:

- REJESTRUJ KAŻDE ZDARZENIE W STADZIE ŚWIŃ W CIĄGU 7 DNI W ARIMR.
- ZABEZPIECZ BUDYNEK, W KTÓRYM UTRZYMUJESZ ŚWINIE PRZED DOSTĘPEM ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH ORAZ DOMOWYCH.
- UTRZYMUJ ŚWINIE W ODRĘBNYCH POMIESZCZENIACH NIEMAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO PRZEJŚCIA DO POMIESZCZEŃ, GDZIE UTRZYMYWANE SĄ POZOSTAŁE GATUNKI ZWIERZĄT KOPYTNYCH.
- ODKAŻAJ RĘCE I OBUWIE PRZED KAŻDYM WEJŚCIEM DO CHLEWNI.
- DO PRACY Z TRZODĄ UŻYWAJ ODZIELNEGO STROJU, KTÓRY POZOSTAWIASZ W CHLEWNI.
- ZADBAJ BY OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ŚWIŃ UŻYWAŁY ODZIEŻY OCHRONNEJ I STOSOWAŁY NIEZBĘDNE ŚRODKI HIGIENY ORAZ UPEWNIJ SIĘ CZY NIE WYKONYWAŁY TYCH CZYNNOŚCI W INNYM GOSPODARSTWIE.
- NIE WPUSZCZAJ NA TEREN CHLEWNI OSÓB POSTRONNYCH.
- ODKAŻAJ NA BIEŻĄCO NARZĘDZIA I SPRZĘT WYKORZYSTYWANY DO OBSŁUGI ŚWIŃ.
- NIE KARM ŚWIŃ ODPADAMI KUCHENNYMI, A PASZE ZABEZPIECZAJ PRZED DOSTĘPEM ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH.
- PRZED WEJŚCIEM DO BUDYKÓW INWENTARSKICH WYŁÓŻ MATY DEZYNFEKCYJNE I NA BIEŻĄCO UZUPEŁNIAJ JE ŚRODKIEM DEZYNFEKUJĄCYM.
- PROWADŹ REJESTR ŚRODKÓW TRANSPORTU DO PRZEWOZU ŚWIŃ WJEŻDŻAJĄCYCH NA TEREN GOSPODARSTWA ORAZ LISTĘ OSÓB, KTÓRE WCHODZĄ DO POMIESZCZEŃ, GDZIE UTRZYMUJESZ ŚWINIE.
- OBSERWUJ SVOJE STADO, A W RAZIE NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW NIEZWŁOCZNIE SKONTAKUJ SIĘ Z LEKARZEM WETERYNARII.
- NA TEREN SVOJEGO GOSPDARSTWA NIE WPROWADZAJ ZWŁOK, TUSZ, CZĘŚCI TUSZ DZIKÓW ORAZ PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z DZIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW, KTÓRE MOGŁY ZOSTAĆ SKAŻONE WIRUSEM.
- NIE OBSŁUGUJ ŚWIŃ, JEŚLI W CIĄGU OSTATNICH 72 H BRAŁEŚ UDZIAŁ W POLOWANIU.

DODATKOWO MOŻESZ CHRONIĆ SVOJE GOSPODARSTWO POPRZEC:

- ODGRODZENIE CHLEWNI OD ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO PŁOTEM LUB ŚCIANĄ BUDYNKU.
- ZABEZPIECZENIE NIE TYLKO ŚCIÓŁKI, ALE TAKŻE OBORNIKA PRZED DOSTĘPEM ZWIERZĄT DZIKICH.
- STOSOWANIE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI STAREJ SŁOMY, A ŚWIEŻĄ PO UPŁYWIE CO NAJMNIEJ MIESIĄCA OD ZBIORU.
- STOSOWANIE MAT DEZYNFEKCYJNYCH PRZED BRAMĄ WJAZDOWĄ NA TEREN GOSPODARSTWA.
- OPRYSKIWANIE KÓŁ CIĄGNIKÓW I PRZYCZEP SKUTECZNYM ŚRODKIEM WIRUSOBÓJCZYM.
- ZAMYKANIE BRAMY WJAZDOWEJ DO GOSPODARSTWA, CO UCHRONI PRZED WTARGNIĘCIEM OSÓB I POJAZDÓW POSTRONNYCH.
- NIE DOPUSZCZENIE DO KONTAKTU SAMOCHODU UTYLIZACYJNEGO Z CHLEWNIĄ – PADLINĘ NALEŻY WYWOZIĆ POZA TEREN GOSPODARSTWA, A NASTĘPNIE ZDEZYNFEKOWAĆ TEREN I SPRZĘT NATYCHMIAST PO ODJECHANIU SAMOCHODU. NIE WPUSZCZAĆ PRACOWNIKA FIRMY UTYLIZACYJNEJ NA TEREN GOSPODARSTWA.
- SPRZEDAŻ ZWIERZĄT W WYZNACZONYM MIEJSCU, A PO SPRZEDAŻY NATYCHMIAST DEZYNFEKOWAĆ TEREN I SPRZĘT.
- UNIKANIE MIEJSC, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ SKAŻONE PRZECZ DZIKI /OGRANICZENIE WIZYT W LESIE.

Bieżące informacje dotyczące działań podejmowanych w celu ograniczenia występowania ASF w stadach świń oraz informacje nt. bioasekuracji dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej www.wir.org.pl w zakładce ASF– bioasekuracja.